

## Zahnbehandlung in Narkose

### Information und Empfehlung

Bei Ihrem Kind wurde eine Zahnbehandlung in Narkose durchgeführt. Beachten Sie folgende Hinweise:

- Achten Sie darauf, dass die Zahnpflege 3x täglich durchgeführt wird, jedoch nicht im Bereich der Wunde.
- Schwellungen können durch Kühlen verhindert oder vermindert werden. Verwenden Sie dafür einen nasskalten Waschlappen oder ein Kühlkissen mit einem Tuch umhüllt.
- Nachblutungen sind meist harmlos und leicht zu stoppen. Lassen Sie Ihr Kind für ca. 1 Stunde auf eine Kompresse oder ein sauberes Taschentuch beißen. Falls die Blutung nicht aufhört, melden Sie sich bitte unverzüglich.

### Ernährung nach der Behandlung

- Eine Stunde nach der Narkose kann Ihr Kind trinken und 2 Stunden nachher essen, wenn die Betäubung vollständig abgeklungen ist. Geben Sie Ihrem Kind in den ersten 2 Tagen nur weiche oder flüssige Nahrung.

### Schmerzen nach der Behandlung

- Empfindet Ihr Kind Schmerzen, können Sie das mitgegebene Schmerzmittel nach Verordnung verabreichen.
- Wundschmerzen nach einer Operation sind normal, sollten die Schmerzen trotz Schmerzmittel weiterbestehen oder über Tage hinaus anhalten, kann dies ein Hinweis für eine Komplikation sein. Wenden Sie sich bitte an uns oder den behandelnden Zahnarzt.

### Körperliche Aktivität

- Sport und alle anderen körperlichen Anstrengungen sollte Ihr Kind in den nächsten 3 Tagen vermeiden.

### Nachkontrolle

Bei allfälligen Fragen/Unklarheiten wenden Sie sich bitte wie folgt an uns:

- **07:30 – 17:00 Uhr Telefon Tagesklinik Montag-Freitag: 071 243 71 30**
- **Ausserhalb Bürozeiten: Beratungs- und Notfalltelefon (0900 144 100 / 2.90 CHF/Min. über Festnetz und Handkunden mit Abo oder 0900 144 200 / 2.90 CHF/Min. mit Prepaid-Handy)**
- **Ab 23:00 Uhr: Medgate 058 387 77 10**
- **Weitere Informationen unter: <https://www.kispisg.ch/beratungstelefon>**

Autor/in:	YW02	Merkblatt – Zahnbehandlung_postoperativ_MB_Eltern.docx				
Geprüft am:	10.02.2023	Version:	01	Freigabe am:	10.02.2023	Seite 1 von 1